

Terrarientier des Monats November 1997

Epicrates striatus (Fischer 1856)

- Gattung:** Epicrates (Wagler 1830) ; Schlankboas mit 7 Arten
- Art:** Epicrates striatus ; Deutsche Bezeichnungen : Silbergraue Schlankboa, Haiti-Boa
Größe : bis 3 m lang
Färbung : Grundfärbung graubraun bis kupferbraun ; Rücken mit hell- bis dunkelgrauen, unregelmäßigen gezackten Flecken, dazwischen verlaufen helle Querbänder; Bauchseite ist grau und wenig gesprenkelt
z.Zt. 5 Unterarten bekannt
- Verbreitung:** Karibik - Inseln Hispaniola und Bahamas
- Verhalten:** Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, kommt sowohl im Geäst als auch im Steingeröll vor. Kann sehr bissig sein (lange Fangzähne)
- Futter:** Vögel, Mäuse und Ratten
Jungtiere ausschließlich Jungvögel und kleine Echsen
- Vermehrung:** Nach 6 Monaten Tragzeit werden 6 bis 20 Junge lebend geboren
(Länge ca. 40 bis 45 cm)
Paarungen bevorzugt Dezember bis März
- Haltung:** E. str. benötigt einen geräumigen und hohen Behälter mit Klettermöglichkeiten und großem Wasserbecken.
Täglich ca. 12 Stunden Beleuchtung; Tagestemperatur: 24 bis 30°C;
nachts: 15 bis 18° C
Jungtiere sind ohne geeignetes Futter schwierig aufzuziehen. (siehe oben)
Stopfen mit nestjungen Mäusen wöchentlich notwendig.
(in Einzelfällen 1 Jahr lang)
Danach problemlos zu halten und zu vermehren.